


MERC 3 AVRIL 2019 PRETESTRESISTANCE

Nombre de participants : 109

1

Quelle est la prévalence actuelle du SARM parmi les souches invasives en France ?



2

Concernant les entérocoques :

La prévalence des ERV en France est >75 %



✓ La majorité des souches d'ERV appartiennent à l'espèce *E. faecium*



La résistance à la daptomycine est fréquente en France



✓ Il y a actuellement une émergence de souches résistantes au linézolide




✓ VanA et VanB sont les



phénotypes
majoritaires


3

Parmi les enzymes suivantes,
lesquelles sont des
carbapénémases ?




4


Parmi les espèces suivantes, lesquelles sont catégorisées comme BHRé ?



5

Le cohorting est une mesure à mettre en œuvre en cas de poussées épidémiques à transmission « contact » mais cette mesure est souvent impossible car elle demande de gros moyen en nombre de lits et du personnel. Parmi les mesures suivantes, choisissez les 2 qui doivent être privilégiées par rapport aux autres :






6


Les inhibiteurs actuels de bêta-lactamase ont une activité concentration dépendante et sont actuellement proposés en association fixe avec une bêtalactamine.

La prescription de ces médicaments doit répondre à des règles d'administration et des objectifs :




même en cas
d'insuffisance
rénale

Allongement de
l'interdose en
cas
d'insuffisance
rénale




Vérification des
concentrations
sanguines
notamment de la
Cmin




7

Quelle est la prévalence actuelle des souches communautaires d'E. coli productrices de BLSE en France ?




8

En règle générale, E coli oxa
48 est sensible à :



9

En règle générale, *Klebsiella pneumoniae* KPC est résistante à :



10

PAVM tardive à *Pseudomonas aeruginosa* mutant surproduisant AmpC.
A priori, quel(s) est/sont le/les antibiotiques qui devraient être actif(s) ?

