

**QRM1. Quelles sont parmi les suivantes les propositions exactes concernant la vaccination chez l'immunodéprimé ?**

- A. La vaccination contre la varicelle peut être réalisée chez l'immunodéprimé si la sérologie est négative
- B. La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chaque année
- D. La vaccination contre les infections invasives à pneumocoque par un schéma combiné doit être renouvelée tous les 5 ans
- C. La vaccination contre le zona est fortement recommandée
- E. les rappels diphtérie tétanos polio +/- coqueluche doivent être réalisés tous les 5 ans

**QRM 2. Concernant la sérologie rougeole :**

- A. Elle doit être réalisée avant vaccination pour les personnes nées avant 1980
- B. Elle doit être réalisée après la première vaccination pour porter l'indication de la seconde dose
- C. Elle doit être réalisée après la deuxième dose pour vérifier l'efficacité de la vaccination
- D. Est le moyen diagnostique de rougeole le plus simple
- E. N'a pas d'indication en clinique

**QRM3. Parmi les vaccinations suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) recommandée(s) chez une patiente de 18 ans en attente de transplantation pulmonaire ?**

- 1. grippe et pneumocoque
- 2. hépatite A et hépatite B
- 3. ROR et varicelle
- 4. BCG
- 5. papillomavirus

**QRM 4. Parmi les vaccins suivants lequel ou lesquels ont montré leur efficacité en post exposition dans la prévention du risque infectieux à titre individuel**

- 1. La coqueluche dans les 72 heures suivant l'exposition
- 2. Hépatite B dans les 8 jours suivant la vaccination
- 3. Rougeole dans les 5 jours suivant l'exposition
- 4. Meningo C dans les 72 heures suivant l'exposition
- 5. Varicelle dans les 72 heures suivant l'exposition

**QRM 5. Parmi les propositions suivantes concernant la vaccination chez les soignants, quelles sont la ou les réponse(s) exactes :**

- A. Le BCG est obligatoire
- B. La vaccination grippe est obligatoire
- C. La vaccination diphtérie –tétanos –polio-coqueluche est recommandée tous les 10 ans
- D. La vaccination rougeole est recommandée quel que soit l'âge avec 2 doses de vaccin
- E. La vaccination varicelle est recommandée uniquement si la sérologie est négative

**QRM 6. Concernant la rougeole et sa prévention, quelle (s) est (sont) la (les) proposition(s) exactes ?**

A. La plupart des cas de rougeole en Europe surviennent chez des personnes ayant reçu 2 doses de vaccin

B. Le vaccin peut être réalisé chez une femme sous biothérapie

C. Après un contact avec un cas de rougeole, on ne doit vacciner que dans les 72h

D. Le vaccin peut être réalisé chez une femme splénectomisée

E. Après un contact rougeole, si on ne peut pas vacciner, les immunoglobulines doivent être utilisées