

Cas Clinique 2. « Contages » _2020 COURT

Une femme de 30 ans, G1P0, enceinte à 13SA, vous contacte car elle a gardé sa nièce qui a développé le lendemain des lésions vésiculeuses évocatrices de varicelle.

1. Quels-sont les risque d'un contage varicelleux pendant la grossesse?
2. Quelles sont les 3 principales questions à poser pour évaluer le risque de varicelle chez cette patiente et guider une éventuelle prise en charge?
3. Il s'agit d'un contage étroit, datant de 48H, chez une femme non immune. Quelle traitement prophylactique pouvez-vous proposer?
 - A. Rien
 - B. Vaccination post exposition
 - C. Immunoglobulines polyvalentes
 - D. Immunoglobulines spécifiques
 - E. Valaciclovir
4. Le fils aîné de cette patiente, maintenant enceinte de 6 mois, a développé depuis une semaine une éruption fébrile de ce type. Quel est votre diagnostic pour l'enfant ? Proposez-vous un suivi spécifique pour la mère, et pourquoi ?



5. Une sérologie syphilis est pratiquée à 6 mois de grossesse : elle met en évidence un TPHA + 2400 U / un test Elisa Positif, et un VDRL + 120 U. Quel est votre diagnostic ? Quelles sont les conséquences possibles de cette infection pour la grossesse? Quelle prise en charge recommandez-vous?