

A detailed map of Gabon, Africa, showing its geographical features and major cities. The map is color-coded with green for land and blue for water. Major cities are marked with dots and labeled in bold. Rivers are shown as blue lines, and the coastline is highlighted in yellow. The map includes a scale bar at the bottom right indicating distances in kilometers (0, 100, 200 km). The map is titled 'GABON' in large, bold, black letters across the top. The surrounding countries are labeled: 'MALABO' to the northwest, 'CAMEROUN' to the north, 'GUINÉE ÉQUAT.' to the west, and 'CONGO' to the south. The Atlantic Ocean is labeled 'Océan Atlantique' along the coast. Major cities shown include Libreville, Port-Gentil, Koulamoutou, and many others. Rivers like the Ogooué, Ivindo, and Koukouni are depicted. The map also shows the equator (0°) and latitude/longitude markers.

Rapatriement sanitaire pour éruption fébrile

15/03/2009 : multiples piqûres au niveau des pieds

19/03/2009 : fièvre, plaques « urticariennes », tronc et bras (visage épargné), prurit +++

**21/03/2009 : extension à tout le corps sauf le visage
céphalées rétro-orbitaires, fièvre, angine**

24/03/2009 : amoxicilline 500mg

**25/03/2009 : éruption généralisée avec œdème du visage
l'amoxicilline est arrêtée**

**26/03/2009 : fièvre à 40°C, odynophagie, éruption
généralisée
→ rapatriement sanitaire**

A l'arrivée :

θ : 37,8 ; TA 110/70

Deux piqûres d'insecte cheville droite

Éruption maculeuse généralisée, pas de décollement

Toux sèche, pharyngite



Quels sont les examens les plus pertinents pour compléter votre bilan ?

- 1. Numération formule sanguine**
- 2. Bilan hépatique complet**
- 3. Charge virale VIH**
- 4. Examen parasitologique des selles**
- 5. Frottis sanguin - goutte épaisse**

1. NFS

2. Bilan hépatique complet

3. Charge virale VIH

4. Examen parasitologique des selles

5. FGE

Hb : 12.5g/dl, plaquettes : 166000 /mm³

CV VIH : négative

CRP : 30mg/l, δ gt 55 U/l, PA 65 U/l,

Bili totale > 10 micromol/l, AST/ALT : 71/86

Quel(s) signe(s) clinique(s) complémentaire(s) recherchez-vous activement?

- 1. Tache noire**
- 2. Chancre d'inoculation (examen gynéco et buccal)**
- 3. Purpura du voile du palais**
- 4. Signe de Koplick**
- 5. Amygdalite avec fausse membrane**

1. Tache noire

2. Chancre d'inoculation (examen gynéco et buccal)

3. Purpura du voile du palais

4. Signe de Koplick

5. Amygdalite avec fausse membrane



Quel est votre diagnostic final?

- 1. Fièvre dengue**
- 2. Leptospirose**
- 3. Primo-infection VIH**
- 4. Syphilis primaire**
- 5. Rougeole**
- 6. Hépatite A en phase pré ictérique**
- 7. MNI**
- 8. Hypersensibilité médicamenteuse**

1. Fièvre dengue
2. Leptospirose
3. Primo-infection VIH
4. Syphilis primaire
5. Rougeole
6. Hépatite A en phase pré ictérique
7. MNI
8. Hypersensibilité médicamenteuse

Sérologie rougeole (EIA) IgM : pos (DO 0.658), IgG : neg


Rougeole du voyageur

- Europe 2008 : 7822 cas
218 cas d'importation (76% d'Europe !)
 - 68 de Suisse
 - 30 du Royaume Uni
 - 30 d'Asie
 - 13 d'Afrique
 - 6 du Moyen Orient...
- France 2005-2007 : 18 des 86 cas de rougeole confirmés liés à un voyage (+ 4 cas liés)
- France 2008 : 14 cas/604 cas (Suisse !, Thaïlande !...)

BEH. 51-52. 2007

BEH. 39-40. 2009

Incidence categories of reported indigenous measles cases per 100,000 inhabitants by country, 2007*



* EUVAC.NET preliminary data. All clinical, laboratory-confirmed or epidemiologically linked cases meeting the requirements for national surveillance were included. The proportion of laboratory-confirmed cases varies in different countries. Note: For Romania the crude incidence is represented in this figure as data on importation status of cases was not included in the dataset provided. To date, no reports were received from Turkey.

Pays où la vaccination est recommandée (BEH juin 2009)

