



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



FICHE PATIENT

Qu'est-ce qu'une infection à gonocoque et à Chlamydia ?

What are gonorrhoea and Chlamydia sexually transmitted infections ?

• Qu'est-ce que le gonocoque

Il s'agit d'une infection sexuellement transmissible (IST) due à une bactérie. Elle peut survenir 2 à 7 jours après un rapport sexuel.

• Qu'est-ce que le Chlamydia

Il s'agit de l'IST la plus fréquente, qui est due à la bactérie *Chlamydia trachomatis*.

• Comment savoir si je suis contaminé

Pour le gonocoque, au niveau de la verge, il se traduit presque tout le temps par des brûlures lorsqu'on urine, un écoulement blanchâtre ou même du sang. Cette infection, une urétrite, est également connue sous le nom de « blennorragie », « gonorrhée » ou « chaude-pisse ».

Au niveau du col vaginal, de la gorge ou de l'anus, il ne donne souvent que peu ou pas de symptômes. Lorsqu'il y en a, il s'agit d'écoulements, de douleur de l'anus ou bien de douleur de type angine.

Pour le Chlamydia, l'infection est souvent sans symptôme, mais il peut néanmoins y avoir des écoulements purulents, des démangeaisons et une sensation de brûlure.

Non traitées, chez l'homme ces infections peuvent atteindre la prostate (prostatite) et le testicule, ainsi que d'autres localisations notamment oculaire et articulaire.

Chez la femme, ces infections peuvent être responsables de stérilité et de troubles de la fertilité.

• Comment réaliser le diagnostic?

Le diagnostic se fait par des tests effectués sur le 1^{er} jet d'urine du matin (chez l'homme), un auto prélèvement

vaginal (pour les femmes), et/ou des écouvillonnages de la gorge et de l'anus.

• Quel est le traitement

Pour le gonocoque, au vu des résistances aux antibiotiques, le traitement recommandé en première intention est de la ceftriaxone en une injection unique intramusculaire. Sauf cas spécifique, un traitement par voie orale ne devrait pas être proposé.

Pour le Chlamydia, le traitement dépend de la localisation et des signes cliniques.

Dans la plupart des cas, il repose sur de la doxycycline, administrée à raison de 100 mg deux fois par jour pendant 7 jours.

Si la location est anale avec des symptômes importants (douleurs, saignements), il peut s'agir d'une lymphogranulomatose vénérienne (LGV), dont le traitement repose sur la doxycycline, administrée à raison de 100 mg deux fois par jour pendant 21 jours.

Chez les patients allergiques, un avis spécialisé est nécessaire.

• Comment m'en protéger

Il n'existe actuellement aucun vaccin pour prévenir les infections à gonocoque ou Chlamydia

La seule prévention possible est l'utilisation du préservatif associée à un dépistage régulier.

<https://doi.org/10.1016/j.mmifmc.2022.09.004>

2772-7432/© 2022 Published by Elsevier Masson SAS on behalf of Société de pathologie infectieuse de langue française (SPLIF).