

# Cas clinique #2

## Contage infectieux et grossesse

Caroline Charlier

**DES Maladies Infectieuses**  
**Octobre 2024**

---

---

Une femme de 30 ans, G1P0, enceinte à 13SA, vous contacte car elle a gardé sa nièce qui a développé le lendemain des lésions vésiculeuses évocatrices de varicelle.

1. Quels-sont les risques d'un contage varicelleux pendant la grossesse?

Une femme de 30 ans, G1P0, enceinte à 13SA, vous contacte car elle a gardé sa nièce qui a développé le lendemain des lésions vésiculeuses évocatrices de varicelle.


2. Quelles sont les 3 questions à poser pour évaluer le risque de ce contagé?

Une femme de 30 ans, G1P0, enceinte à 13SA, vous contacte car elle a gardé sa nièce qui a développé le lendemain des lésions vésiculeuses évocatrices de varicelle.

3. PEC d'une varicelle ? D'un zona?

Une femme de 30 ans, G1P0, enceinte à 13SA, vous contacte car elle a gardé sa nièce qui a développé le lendemain des lésions vésiculeuses évocatrices de varicelle.

Le fils aîné de cette patiente, maintenant enceinte de 6 mois, a développé depuis une semaine une éruption fébrile de ce type. Quel est votre diagnostic pour l'enfant ? Proposez-vous un suivi spécifique pour la mère, et pourquoi ?



Une femme de 30 ans, G1P0, enceinte à 13SA, vous contacte car elle a gardé sa nièce qui a développé le lendemain des lésions vésiculeuses évocatrices de varicelle.

Une sérologie syphilis est pratiquée à 6 mois de grossesse : elle met en évidence un TPHA + 2400 U / un test Elisa Positif, et un VDRL + 120 U. Quel est votre diagnostic ? Quelles sont les conséquences possibles de cette infection pour la grossesse ? Quelle prise en charge recommandez-vous ?