



Quel niveau de connaissance sur le dépistage et l'infection par le VIH chez des étudiants en soins infirmiers ?

Introduction

Les études récentes montrent que les populations les plus jeunes sont de moins en moins concernées par l'infection par le VIH avec un niveau de connaissance plutôt à la baisse. Cette moindre connaissance est associée à un moindre recours au dépistage. De plus, les étudiants en soins infirmiers seront des acteurs importants dans la diffusion de la prévention de l'infection, dans leur activité professionnelle, que ce soit en structure de soins ou en exercice libéral, et dans leur entourage.

Objectifs

Nous avons souhaité évaluer, dans cette population, le niveau de connaissance du dépistage, de la prévention et du traitement du VIH.

Matériel et méthodes


A l'occasion d'une journée "attractivité" organisée dans l'hôpital, le service a fait remplir des questionnaires anonymes aux élèves en 2^{ème} et 3^{ème} année en IFSI (institut de formation en soins infirmiers) et en IFAS (institut de formation d'aide-soignant). Ce questionnaire comportait 7 questions fermées sur le dépistage, la prévention et les modes de transmission du VIH, ainsi que des questions socio-démographiques.

Résultats


Au total, 76 questionnaires ont été recueillis, dont 24 d'étudiants en 2^{ème} année en IFSI, 32 en 3^{ème} année, et 6 en IFAS, avec sans surprise, 59 femmes.

La quasi-totalité, 70/76 savait que le SIDA était la forme avancée de l'infection à VIH. Sans surprise, 59/76 étaient des femmes, 21 avaient moins de 20 ans et 29 entre 21 et 30 ans.

Quelles IST sont diagnostiquées en CegiDD ?



Quels sont les modes de transmission du VIH




Après un RSNP, le résultat du test VIH est fiable après :




■ 24 heures ■ 15 jours ■ 6 semaines ■ 3 mois

Une personne séronégative pour le VIH peut-elle se voir proposer un traitement contre le VIH ?




■ oui ■ non ■ NSP

Que signifie TROD ?



■ Traitement rapide optimal de démarrage
 ■ Test rapide d'orientation diagnostique
 ■ Traitement rapide et obligatoire de dépistage

Je suis séropositif pour le VIH, si ma charge virale est indétectable et que je prends bien mon traitement



Discussion / conclusion

Si les notions basiques, définition du SIDA et modes de transmission, sont parfaitement acquis, les connaissances dans d'autres domaines sont très insuffisantes. Notamment le délai pour la pratique d'un test de dépistage, la connaissance de la PreP, la non-contagiosité en cas de charge virale indétectable, sont encore mal connus.

La prévention, l'éducation à la santé, et la promotion à la santé en population générale passe aussi par la connaissance chez les soignants de notions valides dans ce domaine. Des courtes formations de rappels pourraient être proposées au cours du cursus et de la vie professionnelle.