

PARAMED-09

Facteurs associés à l'infection à VIH chez les Usagers de Drogue

Introduction

L'infection à VIH parmi les usagers de drogues demeure un défi majeur pour la santé publique, avec des implications profondes sur la transmission du virus et les soins de santé.

Objectif général

Ce résumé vise à identifier et à analyser les facteurs associés à l'infection à VIH chez cette population spécifique.

Méthodologie

Une enquête transversale réalisée du 04 décembre 2019 au 15 janvier 2020 et a porté sur un échantillon de 456 personnes âgées de 18 ans ou plus ayant consommées au moins une drogue au cours du dernier mois précédant la collecte des données. Les participants ont été recrutés à l'aide de la méthode du répondent-driven sampling (RDS). Les données quantitatives collectées incluaient des tests de dépistage du VIH, de la syphilis et des hépatites virales. Les analyses des données quantitatives ont été effectuées grâce aux logiciels RDSAT 7.1 et STATA 13.0.

Résultats

La plupart des participants était des hommes (**89,8%** ; intervalle de confiance à 95% IC 95%) : 85 1-94,4) ; avaient au moins 30 ans (**80,9%** IC 95% : 74,9-85,7), avec un âge moyen de 37 ans (IC 95% : 36-38), et aurait au moins atteint le niveau scolaire primaire (**55,7%** ; IC 95% : 49,1-62,1).

Variables	Analyse bivariée			Analyse multivariée		
	RC	IC à 95%	p-value	RCa	IC à 95%	P-value
Groupe d'âge						
18-29 ans	1,00		1,00			
30-44 ans	9,52	1,04 - 86,83	0,05	9,88	0,91 - 106,74	0,06
45 ans et plus	17,96	2,01 - 160,58	0,01	21,58	2,30 - 202,64	0,01 *

Conclusion

La population des usagers de drogue est majoritairement composée d'hommes d'âge moyen de 30 ans et ayant atteint au moins le niveau scolaire primaire. Avoir eu des partenaires sexuels occasionnels au cours des 12 derniers mois et l'âge sont des facteurs de risque indépendants de l'infection à VIH. Le risque de contracter le VIH augmente significativement chez les individus âgés de 45 ans et plus, mettant ainsi en évidence la nécessité de stratégies de prévention et de dépistage ciblées pour cette tranche d'âge spécifique

Mots clés

Epidémiologie ,facteur de risque, infection à VIH, Côte d'Ivoire

Références

Enquête bio-comportementale et cartographique en direction des Usagers de Drogue y compris les usagers de drogue injectable (IBBS UD/UDI 2020)

Viviane N'DA – Founnigué KONE